

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



К. А. САВЕНКОВ

13.05.2021

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата
Тиамулин ВС 45 (Tiamulin VS 45).

(Организация-разработчик: ООО «ВЕТСФЕРА®»,
109518, г. Москва, Грайвороновский 1-й пр., д. 2А, пом. 17, ком. 1А, этаж 5)

Номер регистрационного удостоверения: 77-3-10.18-4254№ПВР-3-36.12/02899

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Тиамулин ВС 45 (Tiamulin VS 45).

Международное непатентованное наименование: тиамулин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Тиамулин ВС 45 содержит в 1 г в качестве действующего вещества тиамулина гидроген fumarата - 450 мг, в качестве вспомогательных веществ: лактозу моногидрат и поливинилпирролидон.

3. Лекарственный препарат представляет собой порошок белого или светло-серого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 2 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Тиамулин ВС 45 выпускают расфасованным по 1 кг и 5 кг в полимерные ведра, укупоренные пластмассовыми крышками с контролем первого вскрытия.

Каждая единица потребительской упаковки сопровождается инструкцией по применению.

5. Лекарственный препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С.

6. Тиамулин ВС 45 следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользуемый лекарственный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Тиамулин ВС 45 отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тиамулин ВС 45 относится к антибактериальным препаратам группы макролидов и азалидов.

10. Тиамулина гидроген фумарат, входящий в состав лекарственного препарата, является полусинтетическим антибиотиком группы плевомутилинов, обладает бактериостатической активностью, подавляя синтез белка микробной клетки на рибосомальном уровне, и проявляет высокую активность в отношении микоплазм, спирохет (*B. hyodysenteriae*, *B. pilosicoli*), грамположительных аэробов и анаэробов (*Clostridium perfringens*), грамотрицательных анаэробов и аэробов; не действует на бактерии семейства *Enterobacteriaceae*.

Тиамулин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в большинство органов и тканей животных, достигая максимальных концентраций в организме птиц через 4 часа, в организме свиней – через 2 часа и сохраняясь на терапевтическом уровне на протяжении 18-24 часов.

Тиамулин ВС 45 по степени воздействия на организм относится к умеренно-опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах хорошо переносится свиньями и птицей.

III. Порядок применения

11. Тиамулин ВС 45 применяют с лечебной целью свиньям при дизентерии, энзоотической бронхопневмонии, микоплазменном артрите, энтероколитах, вызванных *Lawsonia intracellularis*; с лечебной целью цыплятам-бройлерам и индейкам – при микоплазменных инфекциях, вызванных *Mycoplasma gallisepticum* и *Mycoplasma synoviae*.

12. Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к тиамулину. Не следует применять препарат свиньям с выраженной печеночной и почечной недостаточностью.

Запрещается применение Тиамулин ВС 45 курам-несушкам, яйца которых будут использоваться в пищу, и ремонтному молодняку менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением тиамулина в яйцах.

13. При работе с Тиамулином ВС 45 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Во время работы с лекарственным препаратом для ветеринарного применения запрещается пить, курить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки тёплой водой с мылом.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании Тиамулина ВС 45 на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды.

Людам с гиперчувствительностью к тиамулину следует избегать прямого контакта с лекарственным препаратом.

В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Запрещается применение Тиамулина ВС 45 свиноматкам в первый месяц супоросности и племенным хрякам.

15. Тиамулин ВС 45 применяют с водой для поения в следующих дозах:

При дизентерии свиньям 0,02 г препарата на 1 кг массы животного в течение 3-5 дней, при энзоотической пневмонии, вызванной *M. Vuoripneumoniae* 0,035 – 0,045 г на 1 кг массы в течение 5-10 дней, при плевропневмонии 0,045 г на 1 кг массы в течение 5-7 дней.

С лечебной целью бройлерам, ремонтному молодняку и родительскому стаду по 0,067-0,011 г на 1 кг массы в течение 3-5 дней.

Индейкам при микоплазменных инфекциях для лечения цыплятам, молодняку и маточному поголовью 0,056-0,11 г препарата на 1 кг массы птицы в течение 3-5 дней.

В период лечения птицы должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Раствор Тиамулина ВС 45 готовят ежедневно с расчетом на потребление животными в течение суток.

16. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При значительной передозировке у животных может наблюдаться диарея, анорексия, нефротоксические эффекты.

18. Не допускается использование Тиамулина ВС 45 совместно с монензином, салиномицином, наразином и другими ионофорными кокцидиостатиками, антибиотиками аминогликозидного ряда, а также на протяжении 7 дней до и 7 дней после применения указанных лекарственных средств, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты).

19. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска очередной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить в предусмотренном инструкцией режиме дозирования.

21. Убой свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток, цыплят-бройлеров и индеек – через 8 суток после последнего применения Тиамулин ВС 45.

Мясо свиней и птиц, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения

ООО «Ветлайн»
142132, Московская обл., Г.о Подольск,
поселок Дубровицы ФГБНУ ФНЦ ВИЖ
им. Л.К. Эрнста, здание центра
трансплантации эмбрионов
1 этаж, пом. 10-15, 39-47, 49,53

Наименование, адрес организации,
уполномоченной владельцем или
держателем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий
от потребителя

ООО «ВЕТСФЕРА®»
109518, Москва, Грайвороновский 1-й пр.,
д. 2А, пом. 17, ком.1А, этаж 5

Генеральный директор ООО «ВЕТСФЕРА®»



Насибов З.Н.