

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета
ветеринарного контроля и
надзора
МСХ РК



А. А. Аманжол
23.01.2024 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата
Тилозин ВЛ 10 и Тилозин ВЛ 25

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тилозин ВЛ 10 и Тилозин ВЛ 25.

Международное непатентованное наименование: тилозин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Тилозин ВЛ 10 и Тилозин ВЛ 25 в качестве действующего вещества в 1 г содержит тилозин в форме фосфата – 100 мг и 250 мг соответственно, а в качестве вспомогательных веществ: кальция карбонат и отруби пшеничные.

3. По внешнему виду препарат представляет собой порошок от белого до светло-коричневого цвета с вкраплениями от коричневого до темно-коричневого цвета, не растворимый в воде.

4. Препарат выпускают расфасованным по 1 кг и 5 кг в полимерные вёдра, укупоренные навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия или по 0,5 кг, 5 кг и 20 кг в пакеты или мешки из полимерной пленки, ламинированные алюминиевой фольгой.

Маркируют препарат на государственном или русском языках в соответствии с законодательством страны, на территории которого препарат находится в обороте.

5. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя, в защищённом от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 25°C.

6. Срок годности препарата в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 2 года со дня производства.

Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

7. Лекарственный препарат хранят в местах, недоступных для детей.
8. Неиспользованный препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.
9. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Порядок применения

10. Тилозин ВЛ 10 и Тилозин ВЛ 25 относится к антибактериальным препаратам группы макролидов.

11. Тилозин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении многих грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе стафилококков, стрептококков, клостридий, коринебактерий, пастерелл, спирохет, хламидий, трепонем и микоплазм.

12. Механизм бактериостатического действия тилозина заключается в подавлении синтеза белка в бактериальной клетке на рибосомальном уровне.

13. После перорального применения Тилозина ВЛ 10 и 25 тилозина фосфат медленно всасывается в желудочно-кишечном тракте.

13. Выводится тилозина фосфат из организма в основном в неизменном виде, главным образом с фекалиями и частично мочой, у яйценоской птицы – с яйцами.

13. Препарат по степени воздействия на организм относится к малоопасным опасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

14. Препарат назначают с лечебной и лечебно – профилактической целью свиньям при дизентерии, цыплятам при спирохетозе и микоплазмозе, а также других болезней, вызванных чувствительными к тилозину фосфату микроорганизмами.

15. Тилозин ВЛ 10 и 25 применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью свиньям в течение 14 дней групповым способом в смеси с кормом в следующих дозах:

Тилозин ВЛ 10

- свиньям массой до 25 кг в дозе 980 г на 1 тонну корма;
- свиньям массой от 25 кг до 45 кг в дозе 392 г на 1 тонну корма;
- свиньям массой более 45 кг в дозе 196 г на 1 тонну корма.

Тилозин ВЛ 25

- свиньям массой до 25 кг в дозе 392 г на 1 тонну корма;
- свиньям массой от 25 кг до 45 кг в дозе 156 г на 1 тонну корма;
- свиньям массой более 45 кг в дозе 78 г на 1 тонну корма.

Лечение поросят при дизентерии в первые 3-5 дней начинают с применения с питьевой водой лекарственного препарата на основе тилозина тартрата в соответствии с утвержденной инструкцией, а затем продолжают с

применением Тилозина ВЛ 10 и 25 с кормом, в дозе соответственно 980 г и 392 г на 1 тонну корма в течение 10 суток.

С лечебно-профилактической целью при микоплазменных инфекциях птиц Тилозин ВЛ 10 применяют в дозе 7,8-9,8 кг/т, Тилозин ВЛ 25 – в дозе 3,1 - 3,9 кг/т корма цыплятам с первых дней жизни в течение 3-5 дней и затем с 21 - дневного возраста в течение 2 суток.

С лечебной и лечебно-профилактической целью при спирохетозе цыплят Тилозин ВЛ 10 и 25 применяют соответственно в дозе 4,9 кг и 1,9 кг на 1 тонну корма в течение 5-7 суток.

Для равномерного распределения лекарственного препарата в корме рекомендуется его ступенчатое смешивание. С этой целью рассчитанную дозу Тилозин ВЛ 10 и 25 последовательно смешивают с 10 кг, 100 кг и 900 кг комбикорма.

16. Подготовку и применение препарата необходимо проводить под контролем ветеринарного врача. Для обработанных животных не требуется особых условий содержания.

17. При применении препарата ветеринарный специалист ведет учет и представляет отчетность, предусмотренную законодательством страны, в котором данный препарат применяется.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности и появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

При передозировке у животных может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

19. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животных и птиц к макролидным антибиотикам.

Запрещается применять курам-несушкам, ввиду накопления тилозина в яйцах.

Применение препарата животным с период супоросности и лактации допускается только после консультации с ветеринарным врачом.

20. Не следует применять препарат одновременно с лекарственными средствами и кормовыми добавками содержащими бентонит, ввиду возможной адсорбции и снижения антибактериальной активности препарата.

21. Особенности действия при первом применении или при отмене лекарственного препарата не установлено.

22. Следует избегать пропусков при применении очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае несоблюдения установленного срока повторного применения препарата следует применить его как можно быстрее, в той же дозировке и по той же схеме.

23. Убой свиней и птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Тилозина ВЛ 10 и 25. Мясо животных и птиц, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм плотоядным зверям.

24. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами для животных.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.

По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

25. При попадании препарата на кожу и слизистые оболочки необходимо промыть проточной водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к антибиотикам группы макролидов следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Организация-производитель: ООО «Ветлайн», РФ, 142132, Московская обл., г.о. Подольск, поселок Дубровицы, ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, здание центра трансплантации эмбрионов, 1 этаж, пом. 10-16, 19-25, 27-31, 39-47, 49, 53.

Организация-разработчик: ООО «Ветлайн», РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60 «Б», 1 этаж, офис № 7.